

Zadeva: **Obvestilo o pojavu okužbe s Salmonelo v oddelku**

Spoštovani starši in zaposleni,

obveščeni smo bili, da je bil v oddelku vašega otroka potrjen primer okužbe s Salmonelo. Zato vas v nadaljevanju seznanjamo z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Salmoneloza je okužba s salmonelami. Salmonele so bakterije. Poznanih je več vrst salmonel, najpogosteje pa je povzročitelj okužbe Salmonella Enteritidis.

Znaki obolenja so bolečine v trebuhu, bruhanje in driska. Pri otrocih se pojavi tudi povišana telesna temperatura, prisotni so tudi znaki izsušitve.


Način prenosa: Salmoneloza je zoonoza, nalezljiva bolezen, katere povzročitelj se iz živali posredno ali neposredno prenaša na ljudi. S salmonelami je lahko okuženo npr. surovo meso, najpogosteje perutnina, jajca. Če omenjenih živil pred zaužitjem toplotno dobro ne obdelamo, se lahko okužimo. Salmonele se širijo s stikom z okuženimi in obolelimi osebami. Bolnik/okužena oseba izloča salmonele z blatom. Od tod pridejo na roke oziroma v okolje in na druge ljudi.

Pot širjenja: bolezen se širi po fekalno – oralno poti (iz okuženega blata preko ne dovolj umitih rok v usta) ter z onesnaženimi živili in vodo.

Preprečevanje bolezni: dobra osebna higiena, umivanje rok po uporabi stranišča, po menjavi plenice, po rokovanju s surovimi živili (zlasti surovo perutnino), pred in med pripravo hrane in pred ter po jedi. Ustrezno shranjevanje živil, dobra toplotna obdelava živil, uporaba posebnega pribora in deske za obdelavo surovega mesa.

Inkubacijska doba: inkubacijska doba običajno traja od 6 do 72 ur. V času bolezni je bolnik kužen, klice pa lahko izloča dalj časa, vendar ne dlje kot 3 mesece. Pri dojenčkih traja klicenoštvost tudi dlje.

Zdravljenje: Zdravljenje je simptomatsko - skrbeti je treba predvsem za zadosten vnos tekočine. Če bolniku grozi dehidracija, je potrebno poiskati zdravniško pomoč. Pomembna je dosledna higiena, kar pomeni natančno umivanje rok in redno čiščenje sanitarij in drugih površin, ki se lahko onesnažijo s kontaminiranimi izločki. Zelo pomembno je tudi, da bolniki ostanejo doma, dokler imajo prebavne težave.



Kužnost: Po okužbi se salmonele izločajo v blatu v povprečju pet tednov. Pri otrocih, mlajših od pet let, je čas izločanja bakterij daljši.

Otrok se po okužbi lahko vrne v vrtec po 48h od zadnjega bruhanja ali driske. Ob tem se je potrebo zavedati, da otrok virus kljub ozdravitvi še vedno izloča, zato je potrebno izvajati zgoraj naštete ukrepe.

Prosim bodite pozorni na znake okužbe in v primeru pojavnosti za informiranje vzgojiteljic/ vrtca!

Vir: NIJZ

M.Toplice, 10.09.2024

Sestavila: Kim Horvat, OPZHR